

УСЛОВИЯ ЗАРАЖЕНИЯ

1. Посещение леса

- ✓ Клещ сидит на травинках или деревьях.
- ✓ Не может летать или прыгать.
- ✓ Может цепляться за жертву.
- ✓ Может упасть на неё.



2. Занесение клещей животными



3. Занесение клещей людьми

на одежду, с цветами, ветками.

СПОСОБЫ ЗАРАЖЕНИЯ



- ✓ Укус клеша.
- ✓ Раздавливание и втирание присосавшегося клеша.
- ✓ Употребление в пищу инфицированного сырого козьего и коровьего молока.

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Носите в лесу специальную одежду

- ✓ Куртку или рубашку с длинным рукавом, с плотно застегнутыми воротом и манжетами.
- ✓ Головной убор.
- ✓ Высокую закрытую обувь, в которую можно заправить штаны.



2. Используйте репелленты

обрабатывайте одежду и открытые участки тела специальными защитными препаратами.

3. Осматривайте себя

не пренебрегайте само и взаимоосмотрами на привалах и по возвращению домой.

4. Пейте кипяченое молоко

5. Сделайте прививку против клещевого энцефалита!



КЛЕШЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ

ЧТО ТАКОЕ ЭНЦЕФАЛИТ?

Энцефалит – вирусное природно-очаговое заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

Источниками вируса являются более 100 видов животных – крупный рогатый скот, птицы, грызуны и др.

ПЕРЕНОСЧИКИ ВИРУСА



размер
в зависимости от вида
3-25 мм

Среда обитания:

в лесах, на полянах, в парках и других местах, где имеется трава и кусты.

Активность:

теплое время года, с апреля по октябрь, пик активности – июнь-июль.


Как нападает:

Клещ незаметно впивается в кожу жертвы, выделяет со слюной анестезирующее и разжижающее кровь вещество, обезболивающее процесс присасывания. Человек может длительное время не ощущать прикрепившегося клеша.

Через несколько часов после укуса голова насекомого полностью погружается под кожу человека, а брюшко раздувается от выпитой крови.



Вирус сохраняется в течение всей жизни клеша!



Новокузнецкий центр
медицинской профилактики

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

1. Инкубационный период

длится 1,5 - 2 недели.



2. Поражение коры головного мозга

длится несколько дней.

3. Воспаление мозга

Симптомы: головные боли, рвота, потеря сознания (вплоть до комы), температура тела 39-40°.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕША

1. Используйте нить для извлечения клеша

Прочную нитку завязать в узел как можно ближе к хоботку клеша, затем извлечь клеша, медленно раскачивая и подтягивая его вверх.



2. Если на коже осталась черная точка

Во время извлечения клеша оторвалась его головка или хоботок. Обработайте место укуса спиртом или 5% раствором йода и, затем, удалите головку стерильной иглой (предварительно прокаленной на огне) также, как удаляете обычную занозу.

3. Продезинфицируйте место укуса

Как можно быстрее обработайте место укуса клеша любым дезинфицирующим средством – 3-5% раствором зеленки, 5% раствором йода, спиртом и т.п.

4. Тщательно вымойте руки с мылом

5. Обратитесь к врачу

Клеща необходимо исследовать на наличие инфекции. Поместите клеща в стеклянный флакон вместе с слегка намоченным кусочком ваты, плотно закройте крышкой. Храните в холодильнике не более 2 суток.

- ✓ Брать клеша голыми пальцами, раздавливать! **Что делать**
- ✓ Делать резкие движения – клеш разорвется! **Нельзя!**
- ✓ Использовать масло – оно закупорит дыхательные отверстия, и клеш может умереть, так и оставшись в коже!