



## О ДЕЙСТВИЯХ В СЛУЧАЕ РАСПЫЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНЧИКОВ В ШКОЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ



### ОПИСАНИЕ, СОСТАВ, ДЕЙСТВИЕ

Газовый баллончик представляет собой алюминиевый контейнер небольшого объема (обычно 25 - 100 мл) заполненный смесью сильно действующих раздражающих химических веществ. Смесью находится под давлением 8 - 10 атмосфер, поэтому прямое попадание сильной струи в глаза может вызвать не только химический ожог, но и механическое повреждение.

Необходимо помнить, содержимое газовых баллончиков представляет серьезную опасность для детей и людей, страдающих аллергическими заболеваниями, астматиков.

Смертельное действие не характерно и возможно только при поступлении в организм очень высоких доз.

### КЛИНИКА ПОРАЖЕНИЯ

Различают легкую, среднюю и тяжелую степень поражения:

1. Легкая степень - жжение в глазах, небольшое слезотечение, частое мигание. Эти явления проходят через несколько минут.

2. Средняя степень - сильное слезотечение, спазм век, светобоязнь, ощущение рези и «песка» в глазах, отек век. Явления проходят без лечения, не оставляя после себя последствий.

3. Тяжелая степень - наряду с раздражением глаз возникают симптомы поражения верхних дыхательных путей и ЦНС. На первой минуте возникает несдерживаемое слезотечение, резкая болезненность в глазах, светобоязнь, появляются - насморк, кашель, жжение в горле и груди. Появляется тошнота, рвота и сильная головная боль. Эти явления ослабевают через 5-15 минут или выхода из зараженной зоны. Трудоспособность снижается на 20-40 минут. При попадании на влажные кожные покровы могут вызвать покраснение, зуд, отечность.

Защитой от всех перечисленных раздражителей служит противогаз. При его отсутствии можно воспользоваться влажной тканью.

### ПРИ РАСПЫЛЕНИИ СОДЕРЖИМОГО ГАЗОВЫХ БАЛЛОНЧИКОВ В ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО:

1. Сразу же выйти из зараженной зоны.

2. Выйдя из зоны воздействия раздражающих веществ, промыть глаза и пораженные места водой.

При попадании раздражающих веществ на кожу, необходимо промыть водой с небольшим количеством соды и оставить этот участок кожи открытым. Если чувство жжения не проходит, нужно обратиться к врачу. Для уменьшения боли не рекомендуется пользоваться кремами, мазями и маслами.

3. Провести проветривание зараженных помещений в течение полутора-двух часов. При открытии окон в зараженных помещениях воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

4. Руководитель обязан сообщить о происшествии в МБУ «Защита населения и территории» г. Новокузнецка (32-15-15, 32-16-16), скорую помощь (03), УМВД (02), Роспотребнадзор (45-14-13). В сообщении указать учебное заведение, адрес, краткие обстоятельства происшествия, принятые меры.

Родители детей, устроивших ЧП, привлекаются к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

### Телефон экстренного реагирования:

для абонентов сотовой связи

**ЕДИНАЯ  
СЛУЖБА  
СПАСЕНИЯ**

**112**

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА

01

УМВД

02

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

03

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ

СЛУЖБА

350-911

ОПЕРАТИВНЫЙ

ДЕЖУРНЫЙ ЕДДС

32-15-15, 32-16-16